

La tos ferina es grave

Recientes brotes de tos ferina (pertusis) en Washington causaron hospitalizaciones y muertes, la mayoría en bebés menores de 6 meses.



La tos ferina es grave para los bebés. Ellos pueden tener dificultad al comer, respirar y se pueden poner azulados. Muchos de los infantes no pueden toser. Los bebés mayores de seis meses y los que padecen de tos ferina a menudo pueden tener ataques de tos fuerte que hacen difícil el comer, beber, respirar y dormir.

Su niño necesita 5 dosis de la vacuna DTaP para una protección completa

- 2 meses
- 4 meses
- 6 meses
- 15 - 18 meses
- 4 - 6 años



Obtenga la vacuna Tdap para usted y su familia.

Los niños mayores, adolescentes y adultos pueden ayudar a protegerse a ellos mismos y a los bebés recibiendo un refuerzo de la vacuna Tdap.

La tos ferina se contagia fácilmente al toser o estornudar. Los bebés generalmente la contraen de los miembros de familia o de las amistades quienes pueden tener solamente una tos leve y no saber que tienen tos ferina.

La vacuna Tdap es recomendada para las mujeres durante cada embarazo. Las mujeres que no recibieron la vacuna durante el embarazo deben recibirla inmediatamente después de dar a luz.



La tos ferina es grave

Recientes brotes de tos ferina (pertusis) en Washington causaron hospitalizaciones y muertes, la mayoría en bebés menores de 6 meses.



La tos ferina es grave para los bebés. Ellos pueden tener dificultad al comer, respirar y se pueden poner azulados. Muchos de los infantes no pueden toser. Los bebés mayores de seis meses y los que padecen de tos ferina a menudo pueden tener ataques de tos fuerte que hacen difícil el comer, beber, respirar y dormir.

Su niño necesita 5 dosis de la vacuna DTaP para una protección completa

- 2 meses
- 4 meses
- 6 meses
- 15 - 18 meses
- 4 - 6 años



Obtenga la vacuna Tdap para usted y su familia.

Los niños mayores, adolescentes y adultos pueden ayudar a protegerse a ellos mismos y a los bebés recibiendo un refuerzo de la vacuna Tdap.

La tos ferina se contagia fácilmente al toser o estornudar. Los bebés generalmente la contraen de los miembros de familia o de las amistades quienes pueden tener solamente una tos leve y no saber que tienen tos ferina.

La vacuna Tdap es recomendada para las mujeres durante cada embarazo. Las mujeres que no recibieron la vacuna durante el embarazo deben recibirla inmediatamente después de dar a luz.



Las vacunas DTaP y Tdap protegen contra tres enfermedades

La difteria se contagia por toser y estornudar. Causa dolor de garganta, fiebre leve y puede bloquear completamente las vías respiratorias de la persona. La difteria puede causar problemas respiratorios y del corazón, coma, parálisis y la muerte.



Las vacunas DTaP y Tdap protegen contra tres enfermedades

La difteria se contagia por toser y estornudar. Causa dolor de garganta, fiebre leve y puede bloquear completamente las vías respiratorias de la persona. La difteria puede causar problemas respiratorios y del corazón, coma, parálisis y la muerte.



El tétanos ocurre cuando el germen del tétanos entra en una herida profunda o cortadura. Puede causar espasmos musculares, problemas respiratorios y la muerte.



La tos ferina a menudo comienza como un resfriado común con moqueo nasal y estornudos. Luego de una a dos semanas, comienza una tos severa que puede durar semanas o meses. La tos ferina puede causar neumonía, convulsiones, daño cerebral y la muerte.

Llame a su doctor, enfermera o clínica hoy para pedir una cita y vacunar a su niño con DTaP o a usted con Tdap.

Aprenda más

- Escuche a un niño con tos ferina en: www.pertussis.com
- Visite la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en: www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/tosferina/



Para encontrar una clínica de vacunación, llame a:

	WithinReach Family Health Hotline 1-800-322-2588 (711 TTY relay) or www.ParentHelp123.org
---	---



PUBLIC HEALTH
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND HEALTHIER WASHINGTON

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (TDD/TTY llame al 711). Financiado parcialmente por el Programa Federal de Vacunas para Niños.

325-0141S DOH 348-089SP July 2014

El tétanos ocurre cuando el germen del tétanos entra en una herida profunda o cortadura. Puede causar espasmos musculares, problemas respiratorios y la muerte.



La tos ferina a menudo comienza como un resfriado común con moqueo nasal y estornudos. Luego de una a dos semanas, comienza una tos severa que puede durar semanas o meses. La tos ferina puede causar neumonía, convulsiones, daño cerebral y la muerte.

Llame a su doctor, enfermera o clínica hoy para pedir una cita y vacunar a su niño con DTaP o a usted con Tdap.

Aprenda más

- Escuche a un niño con tos ferina en: www.pertussis.com
- Visite la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en: www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/tosferina/



Para encontrar una clínica de vacunación, llame a:

	WithinReach Family Health Hotline 1-800-322-2588 (711 TTY relay) or www.ParentHelp123.org
--	---



PUBLIC HEALTH
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND HEALTHIER WASHINGTON

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (TDD/TTY llame al 711). Financiado parcialmente por el Programa Federal de Vacunas para Niños.

325-0141S DOH 348-089SP July 2014